



## Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes & environs

### Sortie Entomologique au Parc naturel de Livry-sur-Seine en forêt de Fontainebleau

Animateurs: Yves Doux (ANVL)

Nous étions six du Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes à nous joindre au groupe de 19 personnes de l'ANVL sur le parking du "Saut de loup". La journée a été très chaude et la chaleur a éprouvé les organismes.

Très peu connu du grand public, le Parc Naturel de Livry-sur-Seine, au sud de Melun, est classé "Réserve Naturelle Sensible" depuis 2008 et serpente entre la D 39 et la Seine, du quartier du "Pet-au-Diable" dans le bas de Vaux-le-Pénit, en passant par les berges de Livry-sur-Seine, pour aboutir jusqu'aux grandes plaines des Lupins à Chartrettes.

Le Parc actuel s'étend sur environ 176 ha et représente une grande partie de l'ancien parc du château de Livry-sur-Seine (construit au XVII<sup>e</sup> siècle). Il offre ainsi plus de 15 kilomètres de routes champêtres et de chemins forestiers à travers des paysages verdoyants et richement fleuris.

L'entomologie est la branche de la zoologie dont l'objet est l'étude des insectes, et au vu de ce que nous avons pu observer ce jour, une caricature du naturaliste s'est rapidement imposée : le naturaliste, chapeau vissé sur la tête, équipé de tout un attirail, brandissant un filet à papillon dans tous les sens. Tout ceci pour dire que notre journée s'orienta, essentiellement sur les papillons.

- l'azuré des Coronilles ou azuré porte-arceaux ou argus fléché mâle (*Plebejus argyrognomon*), son revers est beige clair orné d'une ligne marginale de points noirs pupillés de bleu vert argenté, doublée d'une ligne de lunules orange puis d'une ligne de points noirs cerclés de blanc.



l'azuré des cytises (*Glaucopsyche alexis*)



le petit Sylvain (*Limenitis camilla*)

le myrtil (*Maniola jurtina*) ⇒



- le demi-deuil ou échiquier commun (*Melanargia galathea*) version noire **Photo** ↗ et version marron. **Photo** ↓



- le tristan (*Aphantopus hyperantus*)

- l'argus bleu ou azuré commun ou azuré de la bugrane (*Polyommatus icarus*)

- le nacré de la ronce ou daphné (*Brenthis daphne*)

- le Robert-le-diable (*Polygonia c-album*), le dessus des ailes présente sur un fond orange vif, des marques brunes et des taches claires en bordure, le revers est marbré de brun, replié le papillon ressemble à une feuille morte. **Photo** ↓



- la piéride de la moutarde ou piéride du lotier (*Leptidea sinapis*). Ce papillon fréquente les milieux ouverts tels que les prairies, les clairières, les lisières, les bordures de chemin en sous-bois clair. Il est assez commun tout au long de l'année et s'identifie par sa petite taille ainsi que son vol lent et maladroit, donnant toujours l'impression qu'il va se poser. (**Photo** en haut à droite ↗)

- le grand nacré (*Argynnis aglaja*, synonyme *Speyeria aglaja*) **Photo** ⇒



la piéride du navet (*Pieris napi*)



la piéride de la rave (*Pieris rapae*)

- la demoiselle (*Calopteryx virgo*)
- le pennipatte bleuâtre ou l'agrion à larges pattes (*Platycnemis pennipes*) est une espèce de demoiselle.
- la libellule écarlate (*Crocothemis erythraea*)
- la libellule fauve (*Libellula fulva*) **Photo** ⇨⇨⇨



- la grande sauterelle verte (*Tettigonia viridissima*)
- le grand bombyle (*Bombylius major*)
- la sylvaine ou hespérie sylvaine (*Ochlodes sylvanus*)
- la chenille processionnaire du chêne (*Thaumetopoea processionea*)
- l'hespérie de la houque ou bande noire (*Thymelicus sylvestris*)



le gomphe vulgaire (*Gomphus vulgatissimus*) ↵



- le lepture tacheté (*Rutpela maculata*), très coloré fait partie des longicornes les plus communs. **Photo** ↑
- la thomise variable appelée aussi araignée-crabe (*Misumena vatia*) est remarquable par ses capacités de dissimulation sur les fleurs qu'elle fréquente. Chez la femelle, le céphalothorax est blanc ou jaune avec une large bande brun-jaune de chaque côté et l'abdomen blanc, jaune ou vert très pâle. **Photo** ↓



Nids en "cheminée" : les *Euménidés* forment une famille d'hyménoptères apocrites. Cette famille comprend des genres de «guêpes solitaires» construisant des petits nids dans le sol séché ; leurs galeries se prolongent par une cheminée de boue. **Photo** ↑



la cétoine dorée (*Cetonia aurata*)



l'ophrys abeille (*Ophrys apifera*)

- l'orpin blanc (*Sedum album*)
- l'orpin âcre ou poivre de muraille (*Sedum acre*)
- le cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea*)
- des stations de serpolet (*Thymus serpyllum*)

- l'orchis bouc (*Himantoglossum hircinum*) en fruits.  
*Himantoglossum* signifie langue en lanière,  
*Loroglossum*, langue étroite en référence au labelle de la fleur,  
*Hircinum* fait référence à l'odeur de bouc des fleurs.

- l'orobanche du gaillet (*Orobanche caryophyllacea*) légèrement plus rosée que celle observée, en sous-bois la semaine précédente. **Photo** ⇒⇒⇒



- la molène thapsus, bouillon blanc (*Verbascum thapsus*) est une espèce commune qui donne une grande plante pouvant atteindre 2 mètres de hauteur. Les feuilles sont duveteuses et les fleurs jaunes ont une odeur douce rappelant celle du miel. **Photo** ↯



Cette Molène bouillon blanc aussi grande et haute qu'elle est, n'en est pas moins vulnérable et doit résister à la voracité de ses locataires qui ne demandent qu'à se gaver. Deux ou trois chenilles (la plus grande fait 5 cm) du papillon de nuit (*Cucullia verbasci*) suffisent pour mettre à mal le feuillage de la plante. **Photo** ↑